

Влияние пассивного курения на детей может быть годами.

Немецкие ученые установили взаимосвязь между курением и развитием респираторных заболеваний в семье курильщика. Риск развития респираторных заболеваний в семье курильщика в 1,4 раза повышается риск появления воспаления среднего уха. Ученые установили взаимосвязь между детскими онкологическими заболеваниями крови, носовой полости и пассивным вдыханием табачного дыма.

Сложно представить, что мать или отец может вложить в руку своего ребенка сигарету, но мало кто знает, что вдыхание пассивного дыма при ребенке можно приравнять к 2-3 сигаретам. ВОЗ призывает всех родителей, которые курят, что они обязаны оградить и защитить своих детей от пассивного курения. Последствия, казалось бы, безвредного «папиного» дыма могут быть фатальными для ребенка и приводить к его инвалидности!



Министерство здравоохранения Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Наркологический диспансер»
г. Омск



644046, г. Омск – 46, ул. Учебная, 189
факс: 8 (3812) 53-08-83 телефон: 8 (3812) 30-27-25
e-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru
сайт: www.buzoond.ru

«Горячая линия» по прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости
телефон: 344 - 003

Пассивное курение

Чем опасно пассивное курение? Многие из нас даже не задумываются о том, что нахождение возле курящего человека вредит здоровью. Мало кто подозревает о том, что при сгорании табака выделяется два потока дыма. Основной поток образуется при «затяжке» курильщика. Он проходит через всю сигарету, попадает в легкие и выдыхается в виде дополнительного (второго) потока. К сожалению, мало кто знает, что именно в этом содержится во много раз больше вредных веществ. В ходе исследований было

Влияние пассивного курения на детей может быть годами. установлено, что в дополнительном потоке содержание никотина и смолы в 4,8 раз больше, чем в основном. Немецкие ученые установили взаимосвязь курения и развития респираторных заболеваний в семье курильщика. Риск развития респираторных заболеваний в семье курильщика в 1,4 раза повышается риск появления воспаления среднего уха. Ученые установили взаимосвязь между детскими онкологическими заболеваниями крови, носовой полости и пассивным вдыханием табачного дыма.



Министерство здравоохранения Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Наркологический диспансер»
г. Омск



Сложно представить, что мать или отец может вложить в руку своего ребенка сигарету, но мало кто знает, что вдыхание пассивного дыма при ребенке можно приравнять к 2-3 сигаретам. ВОЗ призывает всех родителей, которые курят, что они обязаны оградить и защитить своих детей от пассивного курения. Последствия, казалось бы, безвредного «папиного» дыма могут быть фатальными для ребенка и приводить к его инвалидности!

644046, г. Омск – 46, ул. Учебная, 189
факс: 8 (3812) 53-08-83 телефон: 8 (3812) 30-27-25
e-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru
сайт: www.buzoond.ru

«Горячая линия» по прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости
телефон: 344 - 003

Пассивное курение

Чем опасно пассивное курение? Многие из нас даже не задумываются о том, что нахождение возле курящего человека вредит здоровью. Мало кто подозревает о том, что при сгорании табака выделяется два потока дыма. Основной поток образуется при «затяжке» курильщика. Он проходит через всю сигарету, попадает в легкие и выдыхается в виде дополнительного (второго) потока. К сожалению, мало кто знает, что именно в этом содержится во много раз больше вредных веществ. В ходе исследований было

Вред пассивного курения

Вред пассивного курения носит комплексный характер и, как это не странно для многих, оказывает еще более вредоносное влияние на здоровье окружающих курильщика людей. Ученые уже давно доказали взаимосвязь пассивного курения и развития заболеваний: сердечно-сосудистой системы; ЖКТ; дыхательных путей; нервной системы; мочеполовых органов; костного аппарата.

По данным одного из медицинских британских журналов 5 лет жизни возле курильщика может повысить вероятность развития слепоты в 2 раза. Финский врач Маркку Нурминен указывает на то, что ядовитые вещества из выдыхаемого табачного дыма становятся смертным приговором для окружающих его пассивных курильщиков с заболеваниями коронарной системы сердца. По данным ВОЗ именно пассивное курение стало причиной 200 тыс. смертей в год.

Опасность пассивного курения кроется еще и в том, что оно, как и активное табакокурение, увеличивает риск развития раковых заболеваний во много раз. По данным японского здравоохранения риск развития рака молочной железы в 2,6 раза выше у женщин, которые вынуждены вдыхать табачный дым и не могут избегать накуренных помещений. Особенно чувствительны к табачному дыму женщины, у которых еще не началась менопауза – это объясняется тем, что высокая концентрация половых гормонов может участвовать в образовании опухоли в молочной железе.

Ученые установили, что у работников развлекательных учреждений с онкозаболеваниями в 2,6 раза чаще случаев образование раковой опухоли вызвало пассивное курение.

Все вышеперечисленные примеры говорят о том, что вред пассивного курения очевиден для всего общества и каждый потенциальный пассивный курильщик должны задуматься над тем, как избежать от вредоносного влияния пассивного курения.

Пассивное курение и дети

Особенно чувствителен к пассивному курению организм ребенка – и чем младше ребенок, тем более негативно на него влияет табачный дым. По данным ВОЗ практически половина всех детей в мире страдают от курения взрослых. Вдыхание табачного дыма провоцирует: снижение иммунитета; бронхит; пневмонию; бронхиальную астму; отиты; нейробиологические отклонения; заболеваний сердечно-сосудистой системы; образование раковых опухолей.



Вред пассивного курения

Вред пассивного курения носит комплексный характер и, как это не странно для многих, оказывает еще более вредоносное влияние на здоровье окружающих курильщика людей. Ученые уже давно доказали взаимосвязь пассивного курения и развития заболеваний: сердечно-сосудистой системы; ЖКТ; дыхательных путей; нервной системы; мочеполовых органов; костного аппарата.

По данным одного из медицинских британских журналов 5 лет жизни возле курильщика может повысить вероятность развития слепоты в 2 раза. Финский врач Маркку Нурминен указывает на то, что ядовитые вещества из выдыхаемого табачного дыма становятся смертным приговором для окружающих его пассивных курильщиков с заболеваниями коронарной системы сердца. По данным ВОЗ именно пассивное курение стало причиной 200 тыс. смертей в год.

Опасность пассивного курения кроется еще и в том, что оно, как и активное табакокурение, увеличивает риск развития раковых заболеваний во много раз. По данным японского здравоохранения риск развития рака молочной железы в 2,6 раза выше у женщин, которые вынуждены вдыхать табачный дым и не могут избегать накуренных помещений. Особенно чувствительны к табачному дыму женщины, у которых еще не началась менопауза – это объясняется тем, что высокая концентрация половых гормонов может участвовать в образовании опухоли в молочной железе.

Ученые установили, что у работников развлекательных учреждений с онкозаболеваниями в 2,6 раза чаще случаев образование раковой опухоли вызвало пассивное курение.

Все вышеперечисленные примеры говорят о том, что вред пассивного курения очевиден для всего общества и каждый потенциальный пассивный курильщик должны задуматься над тем, как избежать от вредоносного влияния пассивного курения.

Пассивное курение и дети

Особенно чувствителен к пассивному курению организм ребенка – и чем младше ребенок, тем более негативно на него влияет табачный дым. По данным ВОЗ практически половина всех детей в мире страдают от курения взрослых. Вдыхание табачного дыма провоцирует: снижение иммунитета; бронхит; пневмонию; бронхиальную астму; отиты; нейробиологические отклонения; заболеваний сердечно-сосудистой системы; образование раковых опухолей.

